Actualización en VIH: ¿Cuánto abordamos en Prevención Combinada?

LIC. Molina Rocio
Maestranda en Salud Pública- UNAJ y AASAP
Referente del Programa VIH, HEP. VIR. E ITS HRCR

HOSPITAL REGIONAL

Ley N 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hep. Virales, TBC e ITS

01

Ley N.º 23.798
Sancionada en 1990 Ley de sida

02

Ley N 27.675
de Respuesta Integral al VIH, Hep. Virales e ITS en 2022

03

Ley Provincial I Nº 740 Adhesión a la Ley Nacional

04

Ley Provincial Nº 783
Promotores Pares
(2024)

05


Declaración de París en la provincia del Chubut impulsado por ONUSIDA y agencias de la ONU para poner fin a la epidemia del VIH y SIDA para el año 2030 (2024)

06

"**Día Provincial** de las Mujeres y Niñas que Viven y Conviven con VIH" tercer miércoles de marzo de cada año (2026)



BIOMÉDICO
Intervenciones con métodos clínicos y médicos, por ejemplo:
Preservativos y lubricantes
Prueba del VIH
Antirretrovirales para todos
Transmisión vertical
PrEP y PEP
Circuncisión masculina voluntaria
Programas de agujas y jeringas
ESTRUCTURAL
Intervenciones que promueven un ambiente propicio, por ejemplo:
Descriminalización de la transmisión y de los grupos de población clave
Abordaje de género y contra la violencia de género
Leyes para proteger derechos
Intervenciones la reducción del estigma y para la discriminación
COMPORTAMENTAL
Intervenciones que promueven un comportamiento saludable, por ejemplo:
Asesoramiento sobre reducción de riesgo
Educación sexual integral
Programas de educación entre pares
Campañas de marketing social (p. ej., del preservativo)

Números que hablan..




90% menores de 30 años- Datos hasta Septiembre- 2026

Sífilis- 39 casos por mes- a razón de +1 por día



VIH- 3 CASOS POR MES, +13 casos por sífilis por cada nuevo de VIH



Enfoque centrado en las personas

PREP Y PEP

Ofrecimiento de Testeo Rápido

INDETECTABLE
=
INTRANSMISIBLE

Sostener la Adherencia

ESI
Educación sexual para Decidir

REDUCCIÓN DE Estigma y Discriminacion

PRESERVATIVOS

Doxy PREP-
Doxy PEP
(Nuevas estrategias de Prevención)

COMPARACIÓN: DOXY-PEP Y DOXY-PrEP PARA LA PREVENCIÓN DE ITS

INFORMACIÓN EDUCATIVA BASADA EN EVIDENCIA


Doxy-PEP (Profilaxis Post-Exposición)

HASTA 72 HORAS

SE TOMA DESPUÉS DE UNA POSIBLE EXPOSICIÓN

DOSIS ÚNICA

PORCENTAJES DE EFECTIVIDAD
(Doxy-PEP)




Una dosis de doxiciclina tomada tras el contacto sexual reduce el riesgo de estas ITS bacterianas.

Doxy-PrEP (Profilaxis Pre-Exposición)

SE TOMA DE FORMA REGULAR O DIARIA

TOMA CONSTANTE

REDUCCIÓN GENERAL DE RIESGO
(Doxy-PrEP)



Reducción General
56%-60%

El uso continuo de bajas dosis de doxiciclina puede disminuir la probabilidad de infecciones generales.

Fuentes confiables:
CDC y OMS

World Health Organization

CDC



“La Prevención Combinada es Efectiva únicamente cuando la innovación científica se articula con la participación comunitaria y la garantía de derechos”

Gracias por su atención!